

কুমিৰ



কুমিৰ


বাসস্থান

মিঠা জল এবং লোনা জল বাস্তুত্ব

প্রজনন

ডিম পাড়ে: ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল
ডিম ফুটে: এপ্রিল-জুন



প্রজননকাল



আইইউসিএন অবস্থা : দুর্বল

- নিশাচর কিন্তু দিনের বেলা শিকার করতে পারে
- মিঠা জলের হৃদ, নদী এবং জলাভূমিতে বাস করে
- ভূমি এবং জল উভয় জায়গায় বাস করতে পারে
- সহজে দৃশ্যমান নয়; জমিতে ভালোভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং জলে নিমজ্জিত থাকে
- ঠাণ্ডা রক্তের, রোদে নিজেকে গরম করার জন্য উপকূলে রোদ পোয়ায়
- গরম বা ঠাণ্ডা হলে পিছু হটতে গর্ত খনন করে স্বল্প দূরত্বে হঠাত গতিতে আক্রমণ হতে পারে
- খুব ধারালো দাঁত আছে, প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কামড়
- তৎপৰ পাতা শিকারী, আশ্চর্য আক্রমণ শুরু করার আগে শিকারের কাছাকাছি আসার জন্য অপেক্ষা করে
- উত্তোজিত হলে আক্রমণাত্মক হতে পারে

গড় জীবন্দশা



ঘড়িয়াল


অবস্থা : সমালোচনা মূলকভাবে বিপন্ন

- মানুষের জন্য বিপদ্জনক নয়, মাছ শিকার করে
- এর থুতুতে কন্দুবৃদ্ধি থেকে এর নাম এসেছে, যা দেখতে অনেকটা 'ঘৰা' বা ভারতীয় মাটির পাত্রের মতো
- পরিষ্কার জলাশয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক
- জমিতে দীর্ঘ দূরত্ব হাঁটতে পারেনা, হৃষকির ক্ষেত্রে অন্য জলপথে ছড়িয়ে পড়তে পারেনা
- জনসংখ্যার তীব্র হ্রাস, গুরুতরভাবে বিপন্ন

নোনা জলের কুমিৰ

অবস্থা : ন্যূনতম উদ্বিগ্ন

- প্রধানত ভারতের পূর্ব উপকূলে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঁজি পাওয়া যায়; মোহনার লবণাক্ত জলে বাস করে
- ভারতে বিরল, শিকার এবং আবাসস্থল ধৰ্মসের কারণে ১৯৬০ সালে জনসংখ্যার একটি বড় পতনের সম্মুখীন হয়েছিল
- মগার এবং ঘড়িয়ালের বিপরীতে গাছপালা তিপিতে বাসা তৈরি করে



ভারতের একমাত্র ওডিশাতেই তিনটি প্রজাতির কুমিৰ রয়েছে



কুমিৰের উপস্থিতি একটি ভাল জলাশয়ের প্রমাণ

বাসস্থান ক্ষতি, শিকার এবং প্রতিশোধমূলক হত্যা মগার জন্য প্রধান হৃষক

ম্যানগ্রোভ পরিষ্কার করার জন্য কৃষি এবং জলজ পালন আবাসস্থল ক্ষতি ঘটাচ্ছে

খরার সময় কুমিৰ জলাশয়ের সন্ধানে দীর্ঘ দূরত্ব প্রমাণ করতে পারে

তুমি
কি
জানো?

- মগার একসময় ব্যাপক সংখ্যায় ছিল, কিন্তু আজ তাদের জনসংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে
- মাংস ও চামড়ার জন্য তাদের হত্যা করা হয়
- মানুষ কুমিৰের আবাসস্থলে গবাদি পশু চরায়, যা সংঘর্ষের কারণ হয়
- বন্যার সময়, কুমিৰগুলি শহুরে এলাকায় রাস্তায় এবং বাড়িতে ভেসে আসতে পারে। মগারুরা বিশেষ করে বর্ষাকালে তৈরি অস্থায়ী পুলের মাধ্যমে যাতায়াত করে।
- ডিম- এর লিঙ্গ অগুস্ফুটন সময় তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে