


গৌর (বন্য ষাঁড়)



বাসস্থান: জঙ্গলাবৃত পার্বত্য অঞ্চল ও তেজপুর মুক্তি

গড় সংখ্যা:


পৃথিবী জুড়ে: প্রায় 30,000

ভারত: প্রায় 28,000

অবস্থান: বিপদসংকুল



গড় আয়ু:



খাদ্যাভ্যাস:



শ্রেণীর গঠন:

খন্তুভেদের ওপর বাসস্থান পরিবর্তিত হয়ে থাকে

৮-১১ স্ত্রীর সাথে একটি ষাঁড়


মিলনের সময়কাল:

অনেক পুরুষেরা

দলে ঘোগ দেয়

মিলনের পরবর্তী সময়কাল:

পুরুষেরা দল থেকে বেরিয়ে যায়



তুমি কি জানো?

- গৌর উদ্বিদ সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমিরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে
- গৌর শিকার করা হয়ে থাকে পশুর শৌখিন দ্রব্য, শিং, খেলাধুলা এবং কিছু কিছু জায়গায় মাংসের জন্য
- গৌররা গবাদি পশুর রোগ যেমন রাইন্ডারপেস্ট এবং পা ও মুখের রোগে আক্রান্ত হয়
- বাসস্থানের ক্ষতি হল এই প্রজাতির প্রাণীদের কাছে সবচেয়ে বড়ো একটা হৃষকি
- গৌর-মানব দ্বন্দ্ব আগে গুরুতর সমস্যা ছিল না, তবে আবাসস্থল হ্রাসের কারণে এটি একটি সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে
- যেহেতু গৌররা লাজুক, তাই দ্বন্দ্ব মূলত বনের গ্রামে ফসলের ক্ষতি এবং বলপূর্বক অনধিকার প্রবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ
- ক্ষতিপ্রাপ্ত আবাসস্থলের পুনরুজ্জীবন গৌর-মানব দ্বন্দ্ব কর্মাতে পারে

প্রজনন:

প্রজনন বছরব্যাপী হয়, তবে সাধারণত ডিসেম্বর এবং জুনের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায় হয়ে থাকে

প্রজননের সময়কালে ১.৬ কিলোমিটার দূর থেকে পুরুষের ডাক শোনা যায়



প্রজননের বয়স:

২-৩ বছর

গর্ভধারণকাল:

৯ মাস একজন মহিলা প্রতি

১-১.৫ বছরে প্রজনন করে

এক সময়ে ১টি বাচুর
ওজন: ২৩ কেজি

১টি গৌর শাবক

= ১০টি মানব শিশু

গড় ওজন: ১,০০০ কেজি
গড় উচ্চতা: ১.৯ মি

